muelita® Adultos

Benzocaína 10%

Venta Libre
Industria Argentina

GEL TÓPICO

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO

¿Qué contiene MUELITA ADULTOS GEL?
Cada 100 gramos contiene:
Benzocaína 10.0 gramos.
Excipientes: Polietilenglicol 400, Polietilenglicol 4000, Glicerina, Metilparabeno, Colorante Rojo punzó 4R, Sacarina sódica, Esencia de frutilla, Agua purificada, c.s.

Acción: Anestésico local.

¿Para qué se usa MUELITA ADULTOS GEL?:
Alivio temporario del dolor de muelas o relacionado a la aparición de aftas, llagas y ulceraciones de la mucosa bucal y labios.

¿Qué personas NO pueden recibir MUELITA ADULTOS GEL?:
NO USE este medicamento si sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes, ni en niños menores de 12 años.

¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar este medicamento?:
Use sólo en mucosa bucal, no debe ser aplicado en otras partes del cuerpo.
Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 10 minutos.
Use la mínima cantidad posible, no exceda la dosis recomendada.
Se han reportado casos de metahemoglobinemia tras el uso de benzocaína.

"Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento."

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy utilizando este medicamento?:
Si el dolor para el cual está utilizando este medicamento persiste por más de 7 días o empeora, consulte al médico.
La aplicación bucal de benzocaína puede originar problemas para tragar y por lo tanto riesgo de aspiración. Por lo que no se debe comer por una hora luego de su aplicación, ni masticar alimentos o chicles mientras persista el adormecimiento debido al riesgo de morderse la lengua o la mucosa bucal.

08.10 Rev.05

Suspenda el uso y consulte al médico si aparecen síntomas de debilidad, confusión, dolor de cabeza, dificultad para respirar y/o piel color pálida, grisácea o azulada, ya que pueden ser síntomas de metahemoglobinemia.

¿Cómo se usa este medicamento?:
Niños mayores de 12 años y adultos: Aplicar una fina capa sobre la zona afectada con los dedos o con un hisopo de algodón, hasta 4 veces por día o según indicación médica.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si utilicé más cantidad de la necesaria?:
Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.
Hospital de Pediatría "Dr. Ricardo Gutiérrez", Tel.: (011) 4962-6666/2247
Hospital "Dr. A. Posadas", Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata, Tel.: (0221) 451-5555.
Hospital de Niños de Córdoba, Tel.: (0351) 421-5303/422-0391.
Casafe de Rosario, Tel.: (0341) 448-0077/424-2727.

¿Tiene usted alguna pregunta?:
Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con LABORATORIOS CABUCHI S.A. al teléfono 0800-466-7777, vía e-mail a info@cabuchi.com o a través de la web: www.cabuchi.com.
También puede hacerlo a ANMAT Responde, al teléfono 0800-333-1234.

"**Este medicamento, como cualquier otro debe mantenerse fuera del alcance de los niños"**

"Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico"

Forma de conservación: conservar a temperatura entre 15°C y 30°C.

Director Técnico: Carlos Degiovanni. Farmacéutico.

Medicamento Autorizado por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 50.139

Fecha de última revisión del Prospecto autorizado por la ANMAT:
10 de Septiembre de 2014.

Presentaciones: pomos plásticos conteniendo 10, 15 y 20 gramos.

Elaborado en: Laboratorios Cabuchi SA.

Tucumán 1301- Jesús María
Córdoba - Argentina

CABUCHI
Calidad que te cuida

08.10 Rev.05