

SOLUCIÓN TÓPICA

muelita

Aminobenzoato de Etilo 5%

INDUSTRIA ARGENTINA
VENTA LIBRE

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO

¿Qué contiene MUELITA?

Cada 100 mililitros contiene:

Aminobenzoato de etilo 5 gramos.

Excipientes: Alcohol, Glicerina, Esencia de menta, Cloruro de benzalconio, Azul de metileno, Agua destilada; c.s.

Acción: Anestésico local.

¿Para qué se usa MUELITA?:

Alivio temporario del dolor de muelas y/o garganta.

¿Qué personas NO pueden recibir MUELITA?:

NO USE este medicamento si sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes o si tiene antecedentes de alergia a la Benzocaína u otros anestésicos, ni en menores de 15 años.

¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar este medicamento?:

No exceda la dosis recomendada. No debe ser aplicado en otras partes del cuerpo.

Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 10 minutos.

Se han reportado casos de metahemoglobinemia (una alteración de la sangre) tras el uso de benzocaína.

“Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.”

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy utilizando este medicamento?:

Si el dolor para el cual está utilizando este medicamento persiste por más de 48 a 72 horas o empeora, suspenda la medicación y consulte con el médico u odontólogo.

No utilizar este producto por más de 7 días seguidos.

La aplicación bucal de benzocaína puede originar problemas para tragar y por lo tanto riesgo de aspiración. Por lo que no se debe comer por una hora luego de su aplicación, ni masticar alimentos o chicles mientras persista el adormecimiento debido al riesgo de morderse la lengua o la mucosa bucal.

Suspenda el uso y consulte al médico si aparecen síntomas de debilidad, confusión, dolor de cabeza, dificultad para respirar y/o piel color pálida, grisácea o azulada, ya que pueden ser síntomas de metahemoglobinemia.

No emplear simultáneamente con otros antisépticos bucofaríngeos.

¿Cómo se usa este medicamento?:

Adultos y mayores de 15 años: en caso de dolor de muelas, colocar 1 a 2 GOTAS directamente o humedeciendo la zona a tratar con un trozo pequeño de algodón embebido en 3 a 4 GOTAS de MUELITA puro, hasta 3 veces por día. En caso de dolor de garganta, hacer buches o gárgaras, diluyendo ochenta gotas de MUELITA en un vaso con agua tibia hasta 3 veces por día.

“Este medicamento, como cualquier otro debe mantenerse fuera del alcance de los niños”

“Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico”

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si utilicé más cantidad de la necesaria?:

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Hospital de Pediatría "Dr. Ricardo Gutiérrez", Tel.: (011) 4962-6666/2247

Hospital "Dr. A. Posadas", Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata, Tel.: (0221) 451-5555.

Hospital de Niños de Córdoba, Tel.: (0351) 421-5303/422-0391.

Casafe de Rosario, Tel.: (0341) 448-0077/424-2727.

¿Tiene usted alguna pregunta?:

Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con LABORATORIOS CABUCHI S.A.

al teléfono 0800-466-7777, vía e-mail a info@cabuchi.com o a través de la web:

www.cabuchi.com. También puede hacerlo a ANMAT Responde, al teléfono 0800-333-1234.

Forma de conservación: conservar a temperatura entre 15°C y 30°C.

Elaborado en: LABORATORIOS CABUCHI S.A.

Tucumán 1301 esq. San Juan. C.P. 5220. Jesús María. Pcia. de Córdoba. Argentina.

Director Técnico: Farm. Carlos Degiovanni.

Medicamento Autorizado por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 50.139

Fecha de última revisión del Prospecto autorizado por la ANMAT: 10 de Noviembre de 2014.

Presentaciones: vaporizador gotero plástico conteniendo 10, 15 y 20 mililitros.

 CABUCHI

Elaborado y Fraccionado por: Laboratorios Cabuchi S.A.

Tucumán 1301 - Jesús María (X5220BCA) - Córdoba - Rep. Argentina.

www.cabuchi.com - info@cabuchi.com - Tel.: +54 - 3525 - 445901

08.12 REV 5